

VACCINER OG SERA TIL SVIN

SYGDOM	NAVN PÅ VACCINE	DYREGRUPPE	TIDSPUNKT FOR VACCINATION			DOSIS	ADM.VEJ*	BEMÆRKNING
			1. vac. (ikke tidligere vaccinerede dyr)	2. vac	Evt. revaccination (tidligere vaccinerede dyr) med en enkelt dosis			
Colidiaré	Coliprotec F4/F18	Smågrise	En enkelt dosis oralt fra 18-dages alderen.	-	-	2 ml	Oralt	Via drench eller drikkevandet Levende vaccine
	Neocolipor®	Gylte, søer	7-5 uger før faring	2 uger før faring	2 uger før hver efterfølgende faring	2 ml x 2	IM	-
	Porcilis®/Porcoli Diluvac Forte	Gylte, søer	8-6 uger før faring	2-4 uger før faring	2-4 uger før hver forventet faring	2 ml x 2	IM	-
Tarmbrand	Serum mod tarmbrand	Pattegrise	Serumbehandling straks efter fødslen	-	-	5 ml	SC	Kræver særtilladelse**
	ClostriporcA	Gylte, søer	5 uger før forventet faring	3 uger senere	2 uger før hver forventet faring	2 ml x 2	SC	Dækker Cl. Perfringens type A
	Porcilis® T-brand Vet.	Gylte, søer	1 dosis i første halvdel af drægtighedsperioden	3 uger før forventet faring	Ca. 3 uger før hver forventet faring	5 ml x 2	SC	Dækker Cl. Perfringens type C
	Coglamune®	Pattegrise, smågrise, gylte og søer	Pattegrise: 2 uger gamle (fra ikke vaccinerede moderdyr) eller smågrise: 8 uger gamle (fra vaccinerede moderdyr) Drægtige dyr: 9-6 uger før forventet faring	4 uger senere	-	2 ml x 2	SC	Dækker Cl. Perfringens type A, C og D Kræver særtilladelse **
	Covexin 8A, Orion	Gylte, søer	10 uger før faring	4 uger før faring	4 uger før hver forventet faring	4 ml x 2	IM	Dækker Cl. Perfringens type A, C og D Beskytter også søerne mod gaspuster-syndrom (Cl. Novyi) Kræver særtilladelse**
Colidiaré og tarmbrand	Entericolix Vet.	Gylte, søer	7 uger før faring	4 uger før faring	4 uger før faring i hver efterfølgende drægtighed	2 ml x 2	IM	-
	Porcilis ColiClos.	Gylte, søer	8-6 uger før faring	4 uger senere	4-2 uger før hver forventet faring	2 ml x 2	IM	-
	Toxicol Vet	Gylte, søer	6-5 uger før forventet faring.	2 uger før forventet faring.	2 uger før hver forventet faring.	5 ml x 2	SC	-
	Suiseng	Gylte, søer	Ca 6 uger før faring	Ca. 3 uger før faring	3 uger før hver forventet faring	2 ml x 2	IM	Beskytter også søerne mod gaspuster-syndrom (Cl. Novyi)
Rotavirus / Colidiaré	Rokovac Neo	Gylte, søer	6-4 uger før faring	2-4 uger efter første vac. (senest 2 uger før faring)	4-2 uger før hver forventet faring	2 ml x 2	IM	-
Parvovirus (smit-som fosterdød)	Porcilis® Parvo Vet	Gylte, søer	8-2 uger før løbning	-	1 gang årligt.	2 ml	IM	-
	Reprocyt Parvoflex	Gylte, søer	Senest 6 uger før løbning	3 uger senere	Min. hver 6 måned	2 ml x 2	IM	Fremstillet på basis af PPV genotype 2
Rødsyge	Erybac Uno Vet.	Gylte, søer	Svin over 8 uger	-	Hver 6. måned	2 ml	SC	-
	Eryseng	Polte, gylte, søer	Fra 6 måneders alderen	3-4 uger senere (dog senest 3-4 uger før løbning)	Hver 6. måned	2 ml x 2	IM	-
	Porcilis® Ery Vet	Smågrise, gylte, søer	Fra 12-ugers alderen	4 uger senere	Hver 5. måned	2 ml x 2	IM	-
	Ruvax® Vet.	Smågrise, Avlsdyr	Fra 2-ugers alderen	4 uger senere	Hver 6. måned	2 ml x 2	IM	-
Parvovirus/Rødsyge	Eryseng Parvo	Avlsdyr	Fra 6 måneders alderen	3-4 uger senere (og senest 3-4 uger før løbning)	Hver 6. måned	2 ml x 2	IM	-
	Parvoruvax® Vet.	Avlsdyr	Fra 6 måneders alderen	3-4 uger senere (og senest 1 uge før løbning)	Hver 6. måned	2 ml x 2	IM	-
	Porcilis Ery Parvo Vet.		Senest 2 uger før løbning	-	Hver 12. måned (rødsygedelen bør suppleres hver 6. måned)	2 ml	IM	For beskyttelse imod rødsyge anbefales ekstra vaccination med rødsygevaccine 4 uger før/efter 1. vac med EryParvo
Parvovirus/Rødsyge/Leptospirose	Porcilis Ery+Parvo+Lepto	Avlsdyr	8-6 uger før 1. løbning	4 uger senere	Hver 6.-12. måned	2 ml x 2	IM	-
Circovirus (PCV2)	Circovac®	Smågrise, avlsdyr	Smågrise: fra 3-ugers alderen Polte, gylte, søer: min. 6-5 uger før faring	-	3-4 uger senere (og senest 2 uger før faring)	0,5 ml 2 ml x 2	IM IM	-
	Ingelvac® Circo-FLEX	Smågrise, avlsdyr	Fra - ugers alderen	-	-	1 ml	IM	-
	Porcilis® PCV	Smågrise	Fra 3-ugers alderen	-	-	2 ml	IM	-
	Porcilis® PCV ID	Smågrise	Fra 3-ugers alderen og opefter	-	-	0,2 ml	ID	Til IDAL-sprøjte
	Suvaxyn Circo	Smågrise	Fra 21-dages alderen	-	-	2 ml	IM	-
Mycoplasma lungesyge (alm. lungesyge)	Ingelvac® MycoFLEX	Smågrise	Fra 3 ugers alderen	-	-	1 ml	IM	-
	Mhyogen Vet.	Smågrise	Fra 3-ugers alderen	-	-	2 ml	IM	-
	Mycobac Uno Vet.	Smågrise	Fra 2-ugers alderen	-	-	1 ml	IM	-

Circovirus/ Mycoplasma lungesyge	Porcilis® M Hyo ID ONCE	Smågrise	Fra 2-ugers alderen	-	-	0,2 ml	ID	Til IDAL-sprøjte.
	Stellamune® Mycoplasma Vet.	Smågrise	Pattegrise: Fra 1-uges alderen	2-3 uger senere, typisk ved fravæning.	-	2 ml x 2	IM	-
	Stellamune® One Vet	Smågrise	Fra de er 3 dage gamle	-	-	2 ml	IM	-
	Suvaxyn M. Hyo Mono	Smågrise	Fra min. 7 dages-alderen	-	-	2 ml	IM	-
	ThoroVAX® Vet	Smågrise	Pattegrise min. 7 dage Grise ældre end 21 dage	Gentages efter 2-4 uger	-	1 ml x 2 2 ml	IM	-
Circovirus/ Mycoplasma lungesyge	Porcilis® PCV M. Hyo	Smågrise	Fra 3-ugers alderen	-	-	2 ml	IM	-
	Suvaxyn Circo + MH RTU	Smågrise	Fra 3-ugers alderen	-	-	2 ml	IM	-
	Ingelvac® Circo-FLEX og Ingelvac® MycoFLEX	Smågrise	Fra 3-ugers alderen	-	-	2 ml	IM	-
	Mhyosphere PCV ID	Smågrise	Fra 3-ugers alderen og ældre	-	-	0,2 ml	ID	Til intradermal brug
	Ondartet lungesyge (Ap lungesyge)	Hyobac APP2 Vet	Smågrise	Fra 6-ugers alderen	3 uger senere	-	1 ml x 2	IM
Ondartet lungesyge (Ap lungesyge)	Hyobac APP6 Vet	Smågrise	Fra 6-ugers alderen	3 uger senere	-	1 ml x 2	IM	-
	Hyobac APP multi	Smågrise	Fra 6-ugers alderen	3 uger senere	-	1 ml x 2	IM	Vaccinen beskytter mod alle serotyper af A. pleuropneumonia
	Porcilis® APP Vet.	Smågrise	Fra 6-ugers alderen	4 uger senere	-	2 ml x 2	IM	Vaccinen beskytter mod alle serotyper af A. pleuropneumonia
	Suivac® AP	Smågrise, gylte og søer	Fra 6-ugers alderen. Drægtige gylte og søer 8-6 uger før forventet faring	3-4 uger senere	4-2 uger før hver forventet faring	2 ml x 2	IM	Vaccinen beskytter mod alle serotyper af A. pleuropneumonia
	Svineinfluenza-virus	Respiorc® FLU3	Smågrise, polte, gylte og søer	Fra 56-dages alderen	3 uger senere	Evt. booster 14 dage før hver faring	2 ml x 2	IM
Respiorc® FLU-pan H1N1		Smågrise	Fra 8-ugers alderen	3 uger senere	-	1 ml x 2	IM	-
PRRSV	Ingelvac® PRRS Vet.	Slagtesvin	Fra 4-ugers alderen	-	-	2 ml	IM	Levende vaccine mod PRRS-2 Kun til slagtesvin, ikke avlsdyr
	Porcilis® PRRS Vet.	Smågrise	Fra 2-ugers alderen og efter fravæning	-	-	2 ml 0,2 ml	IM ID	Levende vaccine mod PRRS-1 Ikke til avlsdyr Kan også anvendes til IDAL-sprøjte
	Unistrain PRRS	Smågrise Polte, gylte, søer	Smågrise: Fra 4-ugers alderen Polte: 4 uger før løbning. Søer: 2 uger før løbning eller ved 8-9 ugers drægtighed (ca. 60 dage efter løbning)	-	1 dosis i hver reproduktionscyklus	2 ml 0,2 ml	IM ID	Levende vaccine mod PRRS-1 Fås også til intradermal injektion
	Suvaxyn PRRS MLV	Smågrise, gylte og søer	Fra 1-dags alderen og opefter	-	-	2 ml	IM	Levende vaccine mod PRRS-1 ***
	Progressis® Vet.	Polte, søer	Fra 6 måneders alderen	3-4 uger senere (senest 3 uger før løbning)	Dag 60-70 i hver drægtighed	2 ml x 2	IM	Inaktiveret vaccine mod PRRS-1
Lawsonia-infektion	Suivac®PRRS-IN	Smågrise, polte, gylte, søer	Smågrise: fra 6-10 ugers alderen Ikke immuniserede polte/gylte: før løbning	3-4 uger senere	6-4 uger før hver forventet faring	2 ml x 2	IM	Kræver særtilladelse** Inaktiveret vaccine mod både PRRS-1 og PRRS-2
	Enterisol® Ileitis Vet.	Smågrise	Til fravænnede grise fra 3 ugers alderen.	-	-	2 ml.	Oralt	Via drench eller drikkevandet Levende vaccine
Glässer (transport-syge)	Porcilis® Glässer Vet	Smågrise, gylte, søer	Smågrise: min. 5 uger gamle Gylte/søer: 8-6 uger før forventet faring	2 uger senere 4 uger senere	4-2 uger før hver forventet faring	2 ml x 2	IM	Beskytter mod Haemophilus parasuis serotype 5
	Combac E-HP	Smågrise	Fra 6-ugers alderen	3 uger senere	-	1 ml x 2	IM	Beskytter mod Haemophilus parasuis serotype 1, 5 og 13 samt rødsyge serotype 2a og 1a
Streptokok-infektion	Streptovac®	Smågrise	Kort før fravæning	2-3 uger senere	-	2 ml x 2	IM	Kræver særtilladelse** Beskytter mod serotype 2 og 1/2
	Ødemsyge	Ecoporc Shiga	Smågrise	Fra 4-dages alderen	-	-	1 ml	IM
Vepured		Smågrise	Fra de er 2 dage gamle	-	-	1 ml	IM	-
Nysesyge/kighoste	Porcilis AR-T DF	Gylte/søer	6 uger før faring	2 uger før faring	2-4 uger før hver efterfølgende faring	2 ml x 2	IM	-
	Rhiniseng	Gylte/søer	8-6 uger før faring	4-3 uger før faring	4-3 uger før hver faring	2 ml x 2	IM	-

Kilde: medicintildyr.dk - <https://bit.ly/33WOL3J> - Forfatter: svinedyrlæge Trine Christner Månsson, LVK svinedyrlægerne, tcm@lvk.dk, tlf. 21715274

*Administrationsvej er angivet som enten IM (i muskel), SC (subcutant), ID (intradermal) eller oralt (via munden).

** Vaccinen er ikke registreret af Lægemedelstyrelsen, men sælges på dispensation fra Statens Serum Institut.

*** For at begrænse den potentielle risiko for rekombination mellem PRRS-vaccinstammer må der ikke anvendes forskellige PRRS MLV-vacciner på samme gård på samme tid. Skift ikke rutinemæssigt medlem to eller flere kommercielle PRRS MLV-vacciner i en bestand med det formål at forbedre krydsbeskyttelsen.